neodisher® Septo PreClean



Καθαριστικό και απολυμαντικό για την επανεπεξεργασία με βυθισμό θερμοανθεκτικών και θερμοευαίσθητων εργαλείων

Συμπυκνωμένο υγρό

Τομείς εφαρμογής:

- Απολύμανση και πρόπλυση θερμοανθεκτικών και θερμοευαίσθητων εργαλείων, οδοντιατρικών εργαλείων και εύκαμπτων ενδοσκοπίων πριν την αυτόματη επανεπεξεργασία για την καλύτερη δυνατή ασφάλεια του προσωπικού.
- Μακροχρόνιος βυθισμός χειρουργικών και οδοντιατρικών εργαλείων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, π.χ. καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας ή κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
- Επίσης, κατάλληλο για καθαρισμό και απολύμανση με βυθισμό θερμοανθεκτικών και θερμοευαίσθητων εργαλείων συμπεριλαμβανομένων των εύκαμπτων ενδοσκοπίων.

Φάσμα δράσης:

- Βακτηριοκτόνος και μυκητοκτόνος δράση σύμφωνα με τις μεθόδους του DGHM[1] και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα[2], επίσης, δραστικό έναντι των ιών με περίβλημα σύμφωνα με το RKI/DVV[3]. Η δράση του επιβεβαιώνεται από πιστοποιητικά.
- Συμβατό με ανοξείδωτο ατσάλι, ανοδιωμένο αλουμίνιο, μη σιδηρούχα μέταλλα (ορείχαλκος και χαλκός), σιλικόνη και πλαστικό.
- Περιλαμβάνεται στη λίστα VAH[4]- και IHO[5]

Ειδικές ιδιότητες:

- Άριστη καθαριστική δράση χωρίς πήξιμο των πρωτεϊνών.
- Άριστη συμβατότητα με τα υλικά.
- Χωρίς αλδεΰδες και άλατα τεταρτογενούς αμμωνίου.

Εφαρμογή και δοσολογία:

Το neodisher Septo PreClean χρησιμοποιείται με βυθισμό και σε πλυντήρια υπερήχων. Ανάλογα με την επιθυμητή δράση, το ενεργό διάλυμα πρέπει να παρασκευαστεί σύμφωνα με τις συστάσεις δοσολογίας. Τοποθετήστε τα εργαλεία π.χ ενδοσκόπια χωρίς φυσαλίδες αέρα μέσα στο ενεργό διάλυμα και τηρήστε τους παρακάτω αναφερόμενους χρόνους επαφής.
Για προετοιμασία ενεργών διαλυμάτων με neodisher Septo PreClean προτείνεται η χρήση μαλακού νερού ή μαλακού νερού με σκληρότητα μικρότερη των 10° D (1,8 mmol/l). Η σκληρότητα του νερού δεν πρέπει να ξεπερνά τους 20° D (3,6 mmol/l).Για μακροχρόνιος βυθισμό τα εργαλεία μπορούν να παραμείνουν στο διάλυμα του neodisher Septo PreClean με ασφάλεια έως 72 ώρες.

Σύσταση Εφαρμογής (20 °C) Βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, δραστικό έναν σε ιούς με περίβλημα, (συμπεριλ. HIV,HBV,HCV)	
Απολύμανση και καθαρισμός	15 ml/l (1,5%), 15 min
Μακροχρόνιος βυθισμός εργαλείων	10 ml/l (1,0%), κατ' ελάχιστο 30 min
Απολύμανση	15 ml/l (1,5%), 15 min

Το ενεργό διάλυμα neodisher Septo PreClean μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως 7 ημέρες ανάλογα με τα επίπεδα οργανικού φορτίου. Ωστόσο, προτείνουμε καθημερινή αλλαγή του διαλύματος ή ακόμη πιο συχνά όταν υπάρχει μεγάλη συσσώρευση βιολογικού φορτίου.

Το διάλυμα του neodisher Septo PreClean πρέπει να ξεπλένεται πλήρως με νερό (κατά προτίμηση απιονισμένο νερό). Μικρές ποσότητες του neodisher Septo PreClean που μπορεί να παραμείνουν στα εργαλεία όταν αυτά τοποθετηθούν στο πλυντήριο – απολυμαντή, δεν προκαλούν αφρό ούτε απώλεια πίεσης στις αντλίες ανακυκλοφορίας.

Προϊόντα που περιέχουν αλδεΰδες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πριν ή μετά την απολύμανση με το neodisher Septo PreClean.

Γενικές οδηγίες για τη χρήση:

- Μόνο για επαγγελματική χρήση!
- Για οικονομική και ελεγχόμενη δοσολογία, είναι διαθέσιμα βοηθήματα εφαρμογής όπως δοσομετρικές αντλίες και αναμεικτικές συσκευές. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
- Γενικά κατά τον χειρωνακτικό χειρισμό απολυμαντικών συστήνεται η χρήση προστατευτικών γαντιών.
- Παρακαλούμε, όπως τηρείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή των εργαλείων για επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας DIN EN ISO 17664.
- Να μην αναμειγνύεται με άλλα προϊόντα.

[1] σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Γερμανικής Εταιρείας Υγιεινής και Μικροβιολογίας
[2] σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN13727, EN13624, EN14561 και EN14562[3] σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Ινστιτούτου Robert Koch (RKI) και της Γερμανικής Ένωσης για τον έλεγχο των Ιώσεων (DVV)
[4] Ένωση της Εφαρμοσμένης Υγιεινής (VAH)
[5] Βιομηχανική Ένωση Προστασίας Επιφανειών και Υγιεινής (IHO), Γερμανία

neodisher® Septo PreClean

Κλινικές μελέτες:

Η απολυμαντική δράση επιβεβαιώνεται με πιστοποίηση. Αντίγραφα των κλινικών μελετών είναι διαθέσιμα κατόπιν ζήτησης.

Τεχνικές πληροφορίες:

Τιμή pH	8.9 – 8.7 (5- 15ml, υπολογισμένο σε απιονισμένο νερό, 20 °C)
Ιξώδες	<50 mPa s (συμπυκνωμένο, 20 °C)
Πυκνότητα	1.0 g/cm³ (20 °C)

Συστατικά:

Συστατικά σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης No. 648/2004 για τα απορρυπαντικά:
<5 % μη ιονικά τασιενεργά,
5 – 15 % αμφοτερικά τασιενεργά,
επίσης αρώματα
Απολυμαντικοί παράγοντες ανά 100 γρ.:
8,0 γρ. Λαουρική Προπυλενοδυαμίνη (άλας)

Σήμανση CE: CE 0297

Το neodisher Septo PreClean συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/42/EC, Παράρτημα I, που αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Πληροφορίες αποθήκευσης:

Πάντοτε αποθηκεύετε σε χώρο με θερμοκρασία μεταξύ 0 και 30 °C. Αλλαγές στο χρώμα του προϊόντος μπορεί να προκύψουν όταν αποθηκεύεται σφραγισμένο στην εργοστασιακή συσκευασία. Αυτό δεν έχει επίπτωση στις ιδιότητες του προϊόντος που σχετίζονται με την εφαρμογή του.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 3 χρόνια όταν αποθηκεύεται σύμφωνα με τις οδηγίες. Για την ημερομηνία λήξης δείτε τη σήμανση που ακολουθεί, στην ετικέτα του δοχείου, το σύμβολο της κλεψύδρας ⌛.

Προειδοποιήσεις κινδύνων και οδηγίες ασφαλείας:

Για συμπληρωματικές πληροφορίες ασφάλειας δείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας της Ε.Ε. Αυτά είναι διαθέσιμα στο www.drweigert.de στην κατηγορία «Service».

Διαθέστε προς απόρριψη μόνο όταν το δοχείο είναι κενό και κλειστό. Για τη διάθεση των υπολειμμάτων του προϊόντος, αναφερθείτε στο Πληροφοριακό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

MB 4503/3-3
Ημερομηνία Αναθεώρησης: 04/2013

DR. WEIGERT
Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co.
Mühlenhagen 85, D – 20539 Hamburg
KG Telefon: (040) 789 60 – 0
E-Mail: info@drweigert.de
Telefax: (040) 789 60 – 120
Internet: www.drweigert.de